Ladmises au concours pour les petites medailles
mises à leur place

Les observations envoÿées à l'academie par monsieur La forgue lieutenant de mr le premier chirurgien du Roy à Bayonne annoncent un chirurgien instruit des preceptes de l'art, et bien exercé dans le manuel de ses operations. elles sont au nombre de sept. il y en à six sur des maladies graves dont les exemples à la verité (au moins pour la plus part) ne sont pas absolument rares, mais qui ont été gueries par les soins de l'observateur, et par des procedés qui font l'eloge de son sçavoir, et de son experience :

La premiere fait l'histoire d'une plaÿe en l'os sur la partie superieure et laterale gauche du coronal d'un homme de 24 ans bien constitué, faitte par un coup de tranchant d'un demi espadon donné par un homme vigoureux et qui etoit en colere. le chirurgien tentâ la reunion de cette plaïe et il saigna le malade du bras le soir et le lendemain. le malade passa mal la nuit la fievre survint et augmenta; les yeux s'enflamerent; une erisipele couvrit le front et la paupiere gauche, et s'etendit jusques à l'oreille du même côté. le reste de la face etoit bouffi; la plaie etoit

ARC
carton 34
n°- 52

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Doulourense, et il en Decouloit une serosité sanieuse. Tel etoit l'etat du malade lorsque Mr. Lafargue fut mandé le 3e. jour. au premier coup d'oeil mr. Lafargue crut que tous ces accidents pouvoient avoir pour cause la gêne et la tension du pericrâne; il proposa de le Debrider; mais la violence de la fievre et des autres accidents qui devoit être une raison de hâter cette operation (ainsi que mr. Lafargue le fait observer) fut un pretexte pour les consultans ~~pour~~ de la Differer à l'apres midi pour voir l'effet d'amples saignées qui furent ordonnées de quatres en quatres heures. Le soir le malade etant le même la plaïe fut dilatée. on trouva une incision en l'os de la longueur d'un poulce, et profonde d'une demie ligne. on debrida le pericrane, et on pensa methodiquement: cependant les accidents se soutinrent — jusqu'au dix de la maladie malgré les saignées qui furent portées ~~jusques~~ au nombre de quatorze, le regime, les delayans, et tous les secours les mieux indiqués: enfin tout rentra dans l'ordre, l'os s'exfolia et la plaïe guerit...

2e. Obsn.

Il tomba sur la tête d'un vigneron agé de dix huit

ans un caillou du poid de sept à huit livres qui avoit
été jetté en l'air. le blessé fit environ vingt pas pour se
rendre dans la cabanne de la vigne ; là il perdit connoissance
et eut des accidents qui annoncoient d'une maniere non
equivoque la fracture du crâne, et l'épanchement sur le
cerveau. une tumeur sans plaie occupoit la plus grande
partie du parietal gauche. mr. la farque fut mandé ;
il ouvrit cette tumeur par une incision cruciale. il trouva
une fracture en rond de la grandeur d'un ecu de six livres
à la partie moienne et anterieure du parietal avec
enfoncement. malgré l'hemorragie causée par l'incision qu'il
venoit de faire, et à laquelle il remedia de son
mieux sans perdre de temps il se mit en devoir de
relever les pieces enfoncées, et il y reussit ; sa spatule et
ses ciseaux courbes lui servirent d'elevatoires. une
portion de la seconde table, longue de 13 lignes et
large de 4 qui s'étoit glissée sous le crâne entre lui et
la dure mere du côté inferieur du parietal fut extraite
avec beaucoup de peines à cause de sa situation, et aussi
parceque mr. la farque n'avoit que des pincettes ordinaires.
la dure et la pie mere etoient dechirées au centre de la

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

fracture, et le cerveau etoit affaissé. mr. La fargue qui manquoit de tout pensa le malade de son mieux, et le fit conduire à la ville. on le soigna convenablement. Dans le second pensement, et même dans plusieurs des pansements suivants mr La fargue tira plusieurs petites pieces d'os, et releva une portion dela table interne, qui comprimoit le cerveau. la dure mere qui etoit sans mouvement s'étendit, devint blaffarde et se couvrit d'une espece de bouillie: elle fut scorifiée; la suppuration s'établit; les accidents diminuerent et tout etoit dans un état satisfaisant, lorsque le 25e de la maladië mr De la fargue s'appercut que la dure mere s'étoit détachée du crâne dans toute l'etendüe du parietal, et qu'il s'etoit fait un espece de cul de sac vers l'angle inferieur et posterieur de cet os ou le pus sejournoit. mr. de la fargue eut le courage de faire une contre ouverture pour donner une issüe libre au pus en appliquant en cet endroit une couronne de trepan; operation dont on n'avoit peut être point d'exemple avant celle qui est rapportée dans le pr. volume de cette academie page 259. peu de jours apres la dure mere s'exfolia dans toute l'etendüe de la fracture

le cerveau suppura ; il en tomba dans la suitte des
pensemens plusieurs flocons, qui y laisserent un vuide
à loger un oeuf de pigeon : enfin la suppuration diminua
le cerveau se regenera par des boutons charnus qui
partoient de sa substance, les os s'exfolierent, la plaie
fut cicatrisée au bout de quatres mois, et le malade
jouit d'une bonne santé.

Les troisieme et quatrieme observations sont mises en opposition
l'une à l'autre pour prouver l'inutilité et même le danger de
la suture dans certains cas.

Pour Reunir une plaie faite par un couteau de
chasse qui divisoit le ligament annulaire du carpe, le
muscle tenar, et une partie du tendon du long extenseur
du poulce de la main gauche d'un homme de soixante ans
son chirurgien lui fit cinqs points de suture, et saigna
le malade le soir et le lendemain. La fievre, l'inflamma-
-tion, la tension de la main du poignet et de l'avant
bras, le delire et les mouvements convulsifs qui survinrent
successivement mirent le malade à deux doigts de sa perte.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

un medecin qui le voyoit avec le chirurgien ordinaire avoit fait faire trois saignées; mais les accidents augmentants mr la fargue fut mandé. on coupa les fils; les cataplasmes emollients, les saignées, les humectants, le regime &c. ramenerent le calme et le malade guerit.

La 4e. observation a pour objet la section du tendon extenseur du doigt index et celle de la capsule articulaire de la premiere phalange de ce doigt; en sorte que le doigt pendant laissoit voir les têtes des deux phalanges. le doigt fut remis en place, et maintenu par le bandage et par la situation. le blessé guerit en six jours ~~en six~~ ~~jours~~, et se sert de son doigt comme il faisoit avant son accident.

Deux ruptures du tendon d'achille, l'une à la jambe gauche d'un homme de condition agé de 50 ans, et l'autre à celle d'un negotiant à peu pres du même âge font la matiere de la 5e et 7e. observation. ces maladies furent traitées et gueries par la methode decrite

Dans le premier volume des maladies des os de monsieur petit.

enfin dans la septieme il est question de l'extirpation d'une glande parotide, dont le volume egaloit celui d'un oeuf de poule, qui etoit ulcerée, et qui avoit pour cause un vice scrophuleux. nous croyons que ces observations peuvent concourir pour les petites medailles. Deliberé à paris le 8 aoust 1757.

Sauvin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE